

**1ª Questão** Determine, para as funções  $a(x) = x - 1$ ,  $b(x) = x^2 + 2x - 3$ ,  $c(x) = x^3 - 3x$ ,  $d(x) = e^{x^2} - ex^2$  e  $f(x) = \cos(x)^2 + \sin(x)$  (no intervalo  $I_f = [0, 2\pi]$ ), os seguintes itens:

a) O(s) ponto(s) crítico(s), caso exista(m).

$$P_a = \emptyset, P_b = (-1, -4)$$

$$P_{c_1} = (-1, 2) \text{ e } P_{c_2} = (1, -2), P_{d_1} = (-1, 0), P_{d_2} = (0, 1) \text{ e } P_{d_3} = (1, 0)$$

$$P_{f_1} = \left(\frac{\pi}{6}, \frac{5}{4}\right), P_{f_2} = \left(\frac{5\pi}{6}, \frac{5}{4}\right), P_{f_3} = \left(\frac{\pi}{2}, 1\right) \text{ e } P_{f_4} = \left(\frac{3\pi}{2}, -1\right)$$

b) Em qual(is) intervalo(s) são crescente (e decrescente).


$$\text{Crescente: } I_a = \mathbb{R}, I_b = (-1, \infty), I_c = (-\infty, -1) \cup (1, \infty), I_d = (-1, 0) \cup (1, \infty) \text{ e } I_f = \left(0, \frac{\pi}{6}\right) \cup \left(\frac{\pi}{2}, \frac{5\pi}{6}\right)$$

c) O(s) ponto(s) de máximo/mínimo (locais/absolutos) das funções, caso exista(m). Use a segunda derivada.

$$\text{Máx: } M_a = \emptyset, M_b = \emptyset, M_c = (-1, 2), M_d = (0, 1), M_{f_1} = \left(\frac{\pi}{6}, \frac{5}{4}\right) \text{ e } M_{f_2} = \left(\frac{5\pi}{6}, \frac{5}{4}\right)$$

$$\text{Mim: } m_a = \emptyset, m_b(-1, -4), m_c = (1, -2), m_{d_1} = (-1, 0), m_{d_2} = (1, 0), m_{f_1} = \left(\frac{\pi}{2}, 1\right) \text{ e } m_{f_2} = \left(\frac{3\pi}{2}, -1\right)$$

d) Esboce os gráfico das funções.



**2ª Questão** Verifique, justificando, quais das funções abaixo, saísfazem o **Teorema de Rolle**, no intervalo dado, e em caso afirmativo, determine o(s) valores da(s) constante(s) existente(s) dada pelo teorema.

a)  $g_a(x) = x^3 + 3x^2$   
em  $[-2, 1]$

$$c = 0$$

d)  $g_d(x) = \text{sen}(x) - \text{cos}(x)$   
em  $[-\pi, \pi]$

$$c_1 = -\frac{\pi}{4} \text{ e } c_2 = \frac{3\pi}{4}$$

b)  $g_b(x) = e^{x^2} + x^2$   
em  $[-1, 1]$

$$c = 0$$

e)  $g_e(x) = \frac{1}{x^2}$   
em  $[-1, 1]$

Não é contínua em  $x = 0$

c)  $g_c(x) = \text{cos}(x^2 - \pi x)$   
em  $[0, \pi]$

$$c = \frac{\pi}{2}$$

f)  $g_f(x) = \text{sen}(x) - \text{cos}(x)$   
em  $[0, \pi]$

$$g_f(0) \neq g_f(\pi)$$

**3ª Questão** Verifique, justificando, quais das funções abaixo, saísfazem o **Teorema do Valor Intermediário**, no intervalo dado, e em caso afirmativo, determine o(s) valores da(s) constante(s) existente(s) dada pelo teorema.

a)  $h_a(x) = x^2 + 4x - 1$   
em  $[0, 1]$

$$c = \frac{1}{2}$$

d)  $h_d(x) = \ln(x) + x$   
em  $[1, e]$

$$c = e - 1$$

b)  $h_b(x) = x^3 - 1$   
em  $[-\sqrt{3}, \sqrt{3}]$

$$c_1 = -1 \text{ e } c_2 = 1$$

e)  $h_e(x) = x - \text{sen}(x)$   
em  $[0, \pi]$

$$c = \frac{\pi}{2}$$

c)  $h_c(x) = \frac{1}{x}$   
em  $[1, 4]$

$$c = 2$$

f)  $h_f(x) = |x^2 - 1|$   
em  $[0, 2]$

Não é derivável em  $x = 1$

**4ª Questão** Calcule os limites abaixo. Use a regra L'Hôspital, quando necessário, indicando qual o tipo da ideterminação:

a)  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - x}{x^2 + x - 2}$

$$\text{Tipo: } \frac{0}{0}, L = \frac{1}{3}$$

e)  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(x)}{1/x}$

$$\text{Tipo: } \frac{-\infty}{\infty}, L = 0$$

b)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x^3}$

$$\text{Tipo: } \frac{0}{0}, L = \infty$$

f)  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} \ln(x)$

$$\text{Tipo: } 0 \cdot \infty, L = 0$$

c)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \text{cos}(x)}{x^2}$

$$\text{Tipo: } \frac{0}{0}, L = \frac{1}{2}$$

g)  $\lim_{x \rightarrow \infty} x e^{-x}$

$$\text{Tipo: } 0 \cdot \infty, L = 0$$

h)  $\lim_{x \rightarrow \infty} x - \ln(x)$

$$\text{Tipo: } \infty - \infty, L = \infty$$

d)  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1 - x + \ln(x)}{1 + \text{cos}(\pi x)}$

$$\text{Tipo: } \frac{0}{0}, L = -\frac{1}{\pi^2}$$

i)  $\lim_{x \rightarrow \infty} x^{1/x}$

$$\text{Tipo: } \infty^0, L = 1$$

## Alguns Teoremas

**Teorema 1 (Rolle)** *Seja  $f(x)$  uma função contínua no intervalo  $[a, b]$ , derivável no intervalo  $(a, b)$  e  $f(a) = f(b)$ , então existe  $c \in (a, b)$ , tal que  $f'(c) = 0$*

**Teorema 2 (Teorema do Valor Médio)** *Seja  $f(x)$  uma função contínua no intervalo  $[a, b]$ , derivável no intervalo  $(a, b)$ , então existe  $c \in (a, b)$ , tal que  $f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$ , ou de outra forma,  $f(b) - f(a) = f'(c) = (b - a)$*

**Teorema 3 (Regra de L'Hôspital)** *Sejam  $f(x)$  e  $g(x)$  funções deriváveis no ponto  $x = a$ , com  $g'(x) \neq 0$  se:  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$  e  $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$  ou  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \pm\infty$  e  $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \pm\infty$*

*Então  $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$  se tal limite existir (ou for  $\pm\infty$ ).*

### Tabela de Derivadas <sup>1</sup>

a) $[k]' = k$	h) $[b^x]' = b^x \ln(b)$ <sup>2</sup>	n) $[\cotg(x)]' = -\operatorname{cosec}^2(x)$
b) $[x^k]' = k \cdot x^{(k-1)}$	i) $[\ln(x)]' = \frac{1}{x}$	o) $[\operatorname{cosec}(x)]' = -\operatorname{cosec}(x) \cotg(x)$
c) $[g \pm h]' = g' \pm h'$	j) $[\ln_b(x)]' = \frac{1}{x \ln(b)}$ <sup>3</sup>	p) $[\sec(x)]' = \sec(x) \operatorname{tg}(x)$
d) $[k \cdot g(x)]' = k \cdot g'(x)$	k) $[\operatorname{sen}(x)]' = \cos(x)$	q) $[\operatorname{sen}^{-1}(x)]' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ <sup>4</sup>
e) $[g \cdot h]' = g' \cdot h + g \cdot h'$	l) $[\cos(x)]' = -\operatorname{sen}(x)$	r) $[\cos^{-1}(x)]' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
f) $\left[\frac{g}{h}\right]' = \frac{g' \cdot h - g \cdot h'}{h^2}$	m) $[\operatorname{tg}(x)]' = \operatorname{cotg}^2(x)$	s) $[\operatorname{tg}^{-1}(x)]' = \frac{1}{1+x^2}$
g) $[e^x]' = e^x$		

### Tabela de Relações Trigonométricas

a) $\cos(-x) = \cos x$	g) $\operatorname{sen}^2 x + \cos^2 x = 1$
b) $\operatorname{sen}(-x) = -\operatorname{sen} x$	h) $1 + \operatorname{tg}^2 x = \sec^2 x$
c) $\operatorname{tg} x = \frac{\operatorname{sen} x}{\cos x}$	i) $\operatorname{sen}(a \pm b) = \operatorname{sen} a \cos b \pm \cos a \operatorname{sen} b$
d) $\sec = \frac{1}{\cos x}$	j) $\cos(a \pm b) = \cos a \cos b \mp \operatorname{sen} a \operatorname{sen} b$
e) $\operatorname{cosec} x = \frac{1}{\operatorname{sen} x}$	k) $\operatorname{sen} a \operatorname{sen} b = \frac{1}{2}[\cos(a - b) - \cos(a + b)]$
f) $\operatorname{cotg} x = \frac{1}{\operatorname{tg} x}$	l) $\cos a \cos b = \frac{1}{2}[\cos(a - b) + \cos(a + b)]$

<sup>1</sup> Considere  $g$  e  $h$  funções,  $g'$  e  $h'$  derivadas de  $g$  e  $h$ , e as constantes  $k \in \mathbb{R}$ ,  $b > 0$  e  $b \neq 1$

<sup>2</sup> Mudança de base:  $b^x = e^{\ln(b^x)} = e^{x \ln(b)}$

<sup>3</sup> Mudança de base de lnarítmo:  $\ln_b(x) = \frac{\ln(x)}{\ln(b)}$

<sup>4</sup> Função inversa do sen:  $\operatorname{sen}^{-1}(x) = \operatorname{arcsen}(x)$  é o arco cujo o seno é  $x$ .