



UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
CCEN - Departamento de Matemática
<http://www.mat.ufpb.br>

Cálculo III - 1ª Prova
João Pessoa, 21 de agosto de 2023
Professor: Pedro A. Hinojosa

Nome: _____ Matrícula: _____

Questão 1 (2.0 pts) Use a mudança de variáveis $\begin{cases} u = xy \\ v = y \end{cases}$ para calcular a integral dupla $\int_D (x^2 + 2y^2) dA$ sobre a região $D \subset \mathbb{R}^2$ limitada, no primeiro quadrante, pelas curvas $xy = 1$, $xy = 2$, $y = x$ e $y = 2x$.

Questão 2 (3.0 pts.) Calcule as integrais abaixo:

(a) $\int_W (x^2 + y^2 + z^2)^2 dV$, $W : \begin{cases} x^2 + y^2 \leq 1 \\ 0 \leq z \leq 1 \end{cases}$

(b) $\int_0^1 \int_0^{\sqrt{1-x^2}} \int_0^{\sqrt{1-x^2-y^2}} \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} dz dy dx$

Questão 3 (2.0 pts) Calcule, $\int_W \left(\frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \right) dV$ sendo W a região interior ao cone $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ limitada superiormente pela esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ e inferiormente pela esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 1$.


Questão 4 (3.0 pts.) Determine a massa do sólido W limitado pelas superfícies $x^2 + y^2 + z^2 = 9$ e $x^2 + y^2 + z^2 = 2y$ sabendo que sua densidade é dada por $f(x, y, z) = \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2}$.

Boa Prova !!

①

$$\begin{cases} u = xy \\ v = y \end{cases}$$


$$\int_D (x^2 + 2y^2) dA$$



$$\begin{aligned} xy=1 &\Rightarrow u=1 \\ xy=2 &\Rightarrow u=2 \end{aligned}$$

$$y=x \Rightarrow u=y^2=v^2$$

$$y=2x \Rightarrow u=\frac{1}{2}y^2=\frac{1}{2}v^2$$



$$\begin{aligned} y=x &\Rightarrow v=\sqrt{u} \\ y=2x &\Rightarrow v=\sqrt{2u} \end{aligned}$$

$$D_{uv}: \begin{cases} 1 \leq u \leq 2 \\ \sqrt{u} \leq v \leq \sqrt{2u} \end{cases}$$

$$I = \int_D (x^2 + 2y^2) dA = ?$$

$$\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = \det \begin{pmatrix} y & x \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = y$$

$$\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = \frac{1}{y} = \frac{1}{v}$$

$$I = \int_1^2 \int_{\sqrt{u}}^{\sqrt{2u}} \left[\left(\frac{u}{v} \right)^2 + 2v^2 \right] \cdot \frac{1}{v} dv du$$

$$\left(x^2 + 2y^2 = \left(\frac{u}{v} \right)^2 + 2v^2 \right)$$

$$= \int_1^2 \int_{\sqrt{u}}^{\sqrt{2u}} \left(\frac{u^2}{v^3} + 2v \right) dv du$$

$$= \int_1^2 \left(\frac{-u^2}{2v^2} + v^2 \right) \Big|_{\sqrt{u}}^{\sqrt{2u}} du$$

$$\int_1^2 \left[\left(\frac{-u^2}{2(2u)} + 2u \right) - \left(\frac{-u^2}{2u} + u \right) \right] du$$

$$= \int_1^2 \left(\frac{-u}{4} + 2u + \frac{u}{2} - u \right) du$$

$$= \int_1^2 \frac{5u}{4} du = \frac{5u^2}{8} \Big|_1^2 = \frac{5}{8} (4 - 1)$$

$$= \frac{15}{8}$$



② (a) $\int_W (x^2 + y^2 + z^2) dv$, $W: \begin{cases} x^2 + y^2 \leq 1 \\ 0 \leq z \leq 1 \end{cases}$



coord. cilíndricas

$$\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \\ z = z \end{cases}$$

$$W_{r\theta z}: \begin{cases} 0 \leq r \leq 1 \\ 0 \leq \theta \leq 2\pi \\ 0 \leq z \leq 1 \end{cases}$$

$$\int_W (x^2 + y^2 + z^2) dv = \int_0^1 \int_0^{2\pi} \int_0^1 (r^2 + z^2) \cdot r dr d\theta dz$$

$$\int_0^1 (r^2 + z^2) \cdot r dr = ?$$

$$t = r^2 + z \Rightarrow dt = 2r dr$$

$$r=0 \Rightarrow t=z$$

$$r=1 \Rightarrow t=1+z$$

$$\int_0^1 (r^2 + z)^2 r dr = \int_z^{z+1} \frac{1}{2} t^2 dt = \frac{1}{6} t^3 \Big|_z^{z+1}$$

$$= \frac{1}{6} (z+1)^3 - \frac{1}{6} z^3$$


$$\therefore \int_0^1 \int_0^{2\pi} \int_0^1 (r^2 + z)^2 r dr d\theta dz = \int_0^1 \int_0^{2\pi} \left(\frac{1}{6} (z+1)^3 - \frac{1}{6} z^3 \right) d\theta dz$$

$$= \frac{2\pi}{6} \int_0^1 ((z+1)^3 - z^3) dz = \frac{\pi}{3} \left(\frac{1}{4} (z+1)^4 - \frac{1}{4} z^4 \right) \Big|_0^1$$

$$= \frac{\pi}{12} \left[(2^4 - 1) - (1 - 0) \right] = \frac{14\pi}{12} = \underline{\underline{7\pi/6}}$$

$$\left(\int_W (x^2 + y^2 + z^2)^2 dV = 7\pi/6 \right)$$

$$(b) I = \int_0^1 \int_0^{\sqrt{1-x^2}} \int_0^{\sqrt{1-x^2-y^2}} \sqrt{x^2+y^2+z^2} dz dy dx$$



$$\begin{cases} x = \rho \cos\theta \sin\phi \\ y = \rho \sin\theta \sin\phi \\ z = \rho \cos\phi \end{cases}$$

$$W_{\rho\theta\phi}: \begin{cases} 0 \leq \rho \leq 1 \\ 0 \leq \theta \leq \pi/2 \\ 0 \leq \phi \leq \pi/2 \end{cases}$$

$$I = \int_0^1 \int_0^{\pi/2} \int_0^{\pi/2} \sqrt{\rho^2} \rho^2 \sin \phi \, d\theta \, d\phi \, d\rho$$

$$= \frac{\pi}{2} \int_0^1 \int_0^{\pi/2} \rho^3 \sin \phi \, d\phi \, d\rho$$

$$= \frac{\pi}{2} \int_0^1 \rho^3 (-\cos \phi \Big|_0^{\pi/2}) \, d\rho$$

$$= \frac{\pi}{2} \int_0^1 \rho^3 (-(-1)) \, d\rho = \frac{\pi}{2} \int_0^1 \rho^3 \, d\rho$$



$$= \frac{\pi}{8}$$

3

$$\int_W \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}} \, dV$$

W interior ao cone $z = \sqrt{x^2+y^2}$

limitada por cima pela esfera $x^2+y^2+z^2=4$
 = = baixo = = $x^2+y^2+z^2=1$



coord. esféricas

$$W_{\rho\theta\phi} : \begin{cases} 1 \leq \rho \leq 2 \\ 0 \leq \phi \leq \pi/4 \\ 0 \leq \theta \leq 2\pi \end{cases}$$

$$I = \int_W \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}} \, dV$$

$$I = \int_1^2 \int_0^{\pi/4} \int_0^{2\pi} \frac{1}{\sqrt{\rho^2}} \cdot \rho^2 \sin \theta \, d\theta \, d\phi \, d\rho$$

$$= 2\pi \int_1^2 \int_0^{\pi/4} \rho \sin \theta \, d\theta \, d\rho$$

$$= 2\pi \int_1^2 \rho \left(-\cos \theta \Big|_0^{\pi/4} \right) d\rho$$


$$= -2\pi \int_1^2 \rho \left(\frac{\sqrt{2}}{2} - 1 \right) d\rho$$

$$= 2 \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2} \right) \pi \int_1^2 \rho \, d\rho = \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2} \right) \pi (4 - 1)$$

$$= 3 \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2} \right) \pi$$

$\Rightarrow$

④ W limitado por $x^2 + y^2 + z^2 = 9$ e $x^2 + y^2 + z^2 = 2z$



Massa de W = ?

densidade $f(x, y, z) = \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2}$

coord. esféricas

$$\begin{cases} x = \rho \cos \theta \sin \phi \\ y = \rho \sin \theta \sin \phi \\ z = \rho \cos \phi \end{cases}$$

$$W_{\rho \theta \phi} : \begin{cases} 0 \leq \theta \leq 2\pi \\ 0 \leq \phi \leq \pi \end{cases}$$

$$?? \leq \rho \leq 3$$

$$x^2 + y^2 + z^2 = 2z$$

$$\rho^2 = 2\rho \sin \theta \sin \phi$$

$$\rho = 2 \sin \theta \sin \phi$$

$$2 \sin \theta \sin \phi \leq \rho \leq 3$$

$$M(W) = \int_W \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2} dV$$

$$= \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \int_{2\sin\theta\sin\phi}^3 \frac{1}{\rho^2} \cdot \rho^2 \sin\phi \, d\rho \, d\phi \, d\theta$$

$$= \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \left. \rho \sin\phi \right|_{2\sin\theta\sin\phi}^3 d\phi \, d\theta$$

$$= \int_0^{2\pi} \int_0^\pi (3 - 2\sin\theta\sin\phi) \sin\phi \, d\phi \, d\theta$$

$$= \int_0^\pi \int_0^{2\pi} (\quad) d\theta \, d\phi$$

$$= \int_0^\pi \left\{ 2\pi \cdot 3\sin\phi + \left(2\cancel{\sin^2\phi \cos\theta} \right) \Big|_0^{2\pi} \right\} d\phi$$

$$= 6\pi \int_0^\pi \sin\phi \, d\phi = -6\pi \cos\phi \Big|_0^\pi$$

$$= -6\pi (-1 - 1) = \underline{\underline{12\pi}}$$