

UFPB – CCEN – DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I
3ª LISTA DE EXERCÍCIOS – PERÍODO 2005.1

1. Nos exercícios **1a) → 1p)**, calcule o limite de $f(x)$, quando $x \rightarrow a$.

1a) $f(x) = 2x + 5, a = -7$

1b) $f(x) = \frac{3}{\sqrt{3x+1} + 1}, a = 0$

1c) $f(x) = \frac{x^2 + 3x - 10}{x + 5}, a = -5$

1d) $f(x) = \frac{-2x - 4}{x^3 + 2x^2}, a = -2$

1e) $f(x) = \frac{x - 1}{\sqrt{x + 3} - 2}, a = 1$

1f) $f(x) = \frac{\sqrt{x^2 + 8} - 3}{x + 1}, a = -1$

1g) $f(x) = \frac{x^4 - 1}{x^3 - 1}, a = 1$

1h) $f(x) = \frac{3 - \sqrt{x}}{9 - x}, a = 9$

1i) $f(x) = \frac{x^2 + x}{x}, a = 0$

1j) $f(x) = \frac{x^2 + 8x - 20}{x^2 - x - 2}, a = 2$

1k) $f(x) = \frac{1 - \sqrt{1+x}}{\sqrt{x-1} - x}, a = 3$

1l) $f(x) = \frac{x^4 - 2x + 1}{x^3 + 2x^2 + 1}, a = 1$

1m) $f(x) = \frac{\sqrt[3]{x} - \sqrt[3]{2}}{x - 2}, a = 2$

1n) $f(x) = \frac{(3 - x^3)^4 - 16}{x^3 - 1}, a = 1$

1o) $f(x) = \sqrt{\frac{\sqrt{x^2 + 3} - 2}{x^2 - 1}}, a = 1$

1p) $f(x) = \frac{\sqrt[3]{x+2} - 1}{x + 1}, a = -1$

2. Se f é uma função definida em $\mathbb{R}$ e $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 1$, mostre que

a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(3x)}{x} = 3$

b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x^2)}{x} = 0$

3. Se $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{f(x)}{x^2} = 1$, calcule $\lim_{x \rightarrow -2} f(x)$ e $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{f(x)}{x}$.

4. Sabendo-se que $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - 5}{x - 2} = 3$, determine $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$.

5. Se φ é uma função tal que $1 - \frac{x^2}{4} \leq \varphi(x) \leq 1 + \frac{x^2}{2}, \forall x \neq 0$, calcule $\lim_{x \rightarrow 0} \varphi(x)$.

6. Sejam f e g funções com mesmo domínio D , satisfazendo $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$ e $|g(x)| \leq M, \forall x \in D$, onde M é um número real positivo.

Use o Teorema do Sanduíche para mostrar que $\lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot g(x) = 0$.

7. Se g é a função definida por $g(x) = \begin{cases} 1, & \text{para } x \leq 0 \\ -1, & \text{para } x > 0 \end{cases}$, existe $\lim_{x \mapsto 0} g(x)$?

E $\lim_{x \mapsto 0} x^2 g(x)$ existe?

8. Nos exercícios **8a**) $\rightarrow$ **8j**), calcule o limite de $f(x)$ quando $x \rightarrow a_-$ e quando $x \rightarrow a_+$.

$$\mathbf{8a)} \quad f(x) = \frac{x+3}{x+2}, \quad a = -2$$

$$\mathbf{8b)} \quad f(x) = \frac{x}{(x-2)^2}, \quad a = 2$$

$$\mathbf{8c)} \quad f(x) = \frac{2-x}{(1-x)^3}, \quad a = 1$$

$$\mathbf{8d)} \quad f(x) = \frac{x^2-4}{|x-2|}, \quad a = 2$$

$$\mathbf{8e)} \quad f(x) = \frac{\sqrt{x^2+4x+5}-\sqrt{5}}{x}, \quad a = 0$$

$$\mathbf{8f)} \quad f(x) = (x+3) \frac{|x+2|}{x+2}, \quad a = -2$$

$$\mathbf{8g)} \quad f(x) = \frac{\sqrt{2x(x-1)}}{|x-1|}, \quad a = 1$$

$$\mathbf{8h)} \quad f(x) = \frac{x+3}{|x^2-9|}, \quad a = -3$$

$$\mathbf{8i)} \quad f(x) = \frac{x^2-1}{|x-1|}, \quad a = 1$$

$$\mathbf{8j)} \quad f(x) = \frac{x+2}{|x^2-4|}, \quad a = -2$$

9. Calcule $\lim_{x \mapsto 2_+} \sqrt{x-2}$. Existe $\lim_{x \mapsto 2_-} \sqrt{x-2}$?

10. Nos exercícios **10a**) $\rightarrow$ **10z**), calcule os limites indicados.

$$\mathbf{10a)} \quad \lim_{x \mapsto 0_+} \frac{1}{x}$$

$$\mathbf{10b)} \quad \lim_{x \mapsto 0_-} \frac{1}{x}$$

$$\mathbf{10c)} \quad \lim_{x \mapsto 0_+} \frac{1}{x^2}$$

$$\mathbf{10d)} \quad \lim_{x \mapsto 0_-} \frac{1}{x^2}$$

$$\mathbf{10e)} \quad \lim_{x \mapsto 3_+} \frac{5}{x-3}$$

$$\mathbf{10f)} \quad \lim_{x \mapsto 3_-} \frac{5}{x-3}$$

$$\mathbf{10g)} \quad \lim_{x \mapsto 0_+} \frac{2x+1}{x}$$

$$\mathbf{10h)} \quad \lim_{x \mapsto 0_-} \frac{x-3}{x^2}$$

$$\mathbf{10i)} \quad \lim_{x \mapsto 0_+} \frac{3}{x^2-x}$$

$$\mathbf{10j)} \quad \lim_{x \mapsto 0_-} \frac{3}{x^2-x}$$

$$\mathbf{10k)} \quad \lim_{x \mapsto 3_+} \frac{x^2-3x}{x^2-6x+9}$$

$$\mathbf{10l)} \quad \lim_{x \mapsto -1_+} \frac{2x+1}{x^2+x}$$

$$\mathbf{10m)} \quad \lim_{x \mapsto 0_+} \frac{2x+1}{x^2+x}$$

$$\mathbf{10n)} \quad \lim_{x \mapsto -1_+} \frac{3x^2-4}{1-x^2}$$

$$\mathbf{10o)} \quad \lim_{x \mapsto +\infty} (x^4+3x+2)$$

$$\mathbf{10p)} \quad \lim_{x \mapsto -\infty} (x^4-3x+2)$$

$$\mathbf{10q)} \quad \lim_{x \mapsto +\infty} (3x^3+2x+1)$$

$$\mathbf{10r)} \quad \lim_{x \mapsto -\infty} (3x^3+2x+1)$$

$$\mathbf{10s)} \quad \lim_{x \mapsto +\infty} (5-4x+x^2-x^5) \quad \mathbf{10t)} \quad \lim_{x \mapsto -\infty} (5-4x+x^2-x^5)$$

$$\mathbf{10u)} \quad \lim_{x \mapsto +\infty} \frac{5x^3-6x+1}{6x^3+2}$$

$$\mathbf{10v)} \quad \lim_{x \mapsto +\infty} \frac{5x^3-6x+1}{6x^2+x+3}$$

$$\mathbf{10x)} \quad \lim_{x \mapsto -\infty} \frac{5-x}{3+2x}$$

$$\mathbf{10z)} \quad \lim_{x \mapsto +\infty} \frac{\sqrt{x}+1}{x+3}$$

11. Nos exercícios **11a**) $\rightarrow$ **11d**), calcule o limite de $f(x)$, quando $x \rightarrow +\infty$.

11a) $f(x) = x - \sqrt{x+3}$

11b) $f(x) = x - \sqrt{x^2+3}$

11c) $f(x) = x - \sqrt{x^3+3}$

11d) $f(x) = 2x - \sqrt{x^2+3}$

12. Considere f a função definida por $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2-1}{x-1}, & \text{para } x \neq 1 \\ 3 & , \text{ para } x = 1 \end{cases}$.

Calcule $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ e decida se f é contínua em $a = 1$.

13. Seja f uma função real contínua, definida em torno do ponto $a = 1$, tal que

$$f(x) = \frac{x^2 - 3x + 2}{x - 1}, \text{ para todo } x \neq 1. \text{ Quanto vale } f(1)? \text{ Por quê?}$$

14. Determine o valor de k , de modo que cada uma das funções dadas abaixo seja contínua no ponto indicado.

a) $f(x) = \begin{cases} \frac{x^3-8}{x-2}, & \text{para } x \neq 2 \\ k & , \text{ para } x = 2 \end{cases}$, no ponto $a = 2$;

b) $f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{x}-\sqrt{3}}{x-3}, & \text{para } x > 0 \text{ e } x \neq 3 \\ k & , \text{ para } x = 3 \end{cases}$, no ponto $a = 3$.

15. Seja f a função dada por $f(x) = \frac{x^2+x}{x+1}$, se $x \neq -1$, com $f(-1) = 2$.

f é contínua no ponto -1 ? E no ponto 0 ? Por quê?

16. Dê exemplo de uma função f , definida em $\mathbb{R}$, que não seja contínua no ponto 2 , mas que satisfaça $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$.

17. A afirmação “ $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) \Rightarrow f$ é contínua em a ” é verdadeira?

18. Seja f uma função satisfazendo $|f(x)| \leq x^2$, para todo x em $\mathbb{R}$. Mostre que f é contínua no ponto 0 .

19. Encontre os pontos de descontinuidade da função f , definida por

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2x^2+3}{5}, & \text{para } x \leq 1 \\ 6-5x, & \text{para } 1 < x < 3 \\ x-3, & \text{para } x \geq 3 \end{cases}$$


20. Nos exercícios **20a) → 20d)**, esboce o gráfico da função dada e diga se ela é contínua no ponto indicado.

$$\mathbf{20a)} \quad f(x) = \begin{cases} 2 - x, & \text{para } x > 1 \\ x^2, & \text{para } x \leq 1 \end{cases}, \quad a = 0; \quad \mathbf{20b)} \quad f(x) = \frac{x^2 - 2x - 3}{x + 1}, \quad a = -1;$$

$$\mathbf{20c)} \quad f(x) = \begin{cases} \frac{x-2}{|x-2|}, & \text{para } x \neq 2 \\ 1, & \text{para } x = 2 \end{cases}, \quad a = 0;$$

$$\mathbf{20d)} \quad f(x) = \begin{cases} 0, & \text{para } x < 0 \\ \llbracket x \rrbracket, & \text{para } x \geq 0 \end{cases}, \quad a = 1, \text{ onde } \llbracket x \rrbracket \text{ representa "o maior inteiro que não supera } x", \text{ ou, equivalentemente, "o maior inteiro menor ou igual a } x".$$

21. Se f é a função cujo gráfico encontra-se esboçado abaixo, determine:



a) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x);$

b) $\lim_{x \rightarrow 3} f(x);$

c) $f(3).$

f é contínua no ponto 0?

E no ponto 3?

22. Existe um número α capaz de fazer com que $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{3x^2 + \alpha x + \alpha + 3}{x^2 + x - 2}$ exista?

23. Uma companhia ferroviária cobra R\$10,00 por km, para transportar um vagão até uma distância de 200km, cobrando ainda R\$8,00 por cada km que exceda a 200. Além disso, essa mesma companhia cobra uma taxa de serviço de R\$1.000,00 por vagão, independentemente da distância a percorrer.

Determine a função que representa o custo para transportar um vagão a uma distância de x km e esboce seu gráfico. Essa função é contínua para $x = 200$?

24. Uma fábrica é capaz de produzir 15.000 unidades de um certo produto, em um turno de 8 horas de trabalho. Para cada turno de trabalho, sabe-se que existe um custo

fixo de R\$2.000,00, relativo ao consumo de energia elétrica. Supondo-se que, por unidade produzida, o custo variável, dado o gasto com matéria prima e salários, é de R\$2,00, determine a função que representa o custo total para a fabricação de x unidades e esboce seu gráfico. A função encontrada é contínua para $0 \leq x \leq 45.000$?

25. Um estacionamento cobra R\$3,00 pela primeira hora, ou parte dela, e R\$2,00 por hora sucessiva, ou parte, até o máximo de R\$10,00. Esboce o gráfico do custo do estacionamento como uma função do tempo decorrido e analise as descontinuidades dessa função.

26. Prove que a equação $x^5 + x + 1 = 0$ tem pelo menos uma raiz no intervalo $[-1, 0]$.

27. Prove que a equação $x^3 - 4x + 2 = 0$ admite três raízes reais distintas.

28. Se $f(x) = \begin{cases} x^2 + 2, & \text{para } -2 \leq x < 0 \\ -x^2 - 2, & \text{para } 0 \leq x \leq 2 \end{cases}$, existe $\alpha \in [-2, 2]$ tal que $f(\alpha) = 0$?

Este fato contradiz o Corolário do Teorema do Valor Intermediário?

