



Universidade Federal da Paraíba
CCEN - Departamento de matemática
<http://www.mat.ufpb.br>

Lista de Exercícios Nº 6 : Introdução à Álgebra Linear

Prof.: Pedro A. Hinojosa

1 Seja $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, definida por $T(1, 0, 0) = (1, 1, 0)$, $T(0, 1, 0) = (-1, 1, 2)$ e $T(0, 0, 1) = (2, 0, 1)$. Determine uma base para cada um dos seguintes subespaços: $\ker(T)$, $\text{Im}(T)$, $\ker(T) \cap \text{Im}(T)$ e $\ker(T) + \text{Im}(T)$.

2 Verifique que cada uma das aplicações lineares abaixo é um isomorfismo e encontre a aplicação inversa.

(1) $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $T(x, y, z) = (z, y - 4z, x - 3y - 2z)$;

(2) $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $T(x, y, z) = (x, x - y, 2x + y - z)$.

3 Sejam $F, G : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, definidas por $F(x, y, z) = (y + z, x + z, x + y)$ e $G(x, y, z) = (x + 2y, y - z, x + 2z)$. Determine: $F \circ G$, $\ker(F \circ G)$, e $\text{Im}(F \circ G)$.

4 Determine uma aplicação linear $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$ tal que $\text{Im}(T) = \text{span}\{(1, 1, 2, 1), (2, 1, 0, 1)\}$

5 Determine $[T]_{\mathcal{B}_2}^{\mathcal{B}_1}$ para as transformações T e as bases $\mathcal{B}_1$ e $\mathcal{B}_2$ dadas abaixo:

(1) $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$, $T(x, y, z) = (x + y + z, x - z, x + y, x + 2y + 3z)$,
 $\mathcal{B}_1 = \{(1, 0, 1), (0, 1, 1), (0, 0, 1)\}$ $\mathcal{B}_2 = \{(1, 1, 0, 0), (0, 1, 1, 0), (0, 0, 1, 1), (0, 0, 0, 1)\}$;

(2) $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $T(x, y, z) = (y + z, x + z, x + y)$
 $\mathcal{B}_1 = \{(1, 1, 0), (0, 1, 1), (0, 0, 1)\}$ $\mathcal{B}_2 = \{(0, 0, 1), (0, 1, 1), (1, 1, 0)\}$;

(3) $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $T(x, y) = (x + y, x - y)$
 $\mathcal{B}_1 = \{(1, 0), (0, 1)\}$ $\mathcal{B}_2 = \{(-1, 0), (0, -1)\}$.

6 Encontre isomorfismos entre os espaços $\mathbb{E}$ e $\mathbb{F}$ dados abaixo:

(1) $\mathbb{E} = \mathbb{R}^2$, $\mathbb{F} = \{(x, y, z, w) \in \mathbb{R}^4 : x + y = 0, z + w = 0\}$;

(2) $\mathbb{E} = \mathbb{R}^4$, $\mathbb{F} = \mathcal{P}_3(\mathbb{R})$ (polinômios de grau menor ou igual a 3);

(3) $\mathbb{E} = \mathbb{R}^4$, $\mathbb{F} = \mathcal{M}(2 \times 2, \mathbb{R})$ (matrizes 2×2 reais).

7 Dadas as bases $\mathcal{B}_1 = \{(1, 1), (-1, 1)\}$ de $\mathbb{R}^2$ e $\mathcal{B}_2 = \{(1, 0, 1), (0, 1, 0), (0, 1, 1)\}$ de $\mathbb{R}^3$ encontra a transformação linear $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ tal que $[T]_{\mathcal{B}_2}^{\mathcal{B}_1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -3 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$

8 Seja $T : \mathbb{E} \rightarrow \mathbb{F}$ uma transformação linear. Suponha que, $\dim(\mathbb{E}) = n$ e $\dim(\mathbb{F}) = m$. Mostre que, se $n > m$, então T não é injetiva e que se $n < m$, então T não é sobrejetiva.