Os 5 sólidos platônicos e a busca pelo número de retas numa superfície projetiva

Jacqueline Rojas (UFPB)
Sally Andria (UFF)

Verão UFPB

Sólidos Platônicos

Um *Sólido Platônico* é um poliedro convexo com duas exigências.

Poliedro: é um sólido limitado por polígonos;

Convexo: qualquer reta secante possui exatamente dois pontos em comum com o poliedro.

- todas suas faces são polígonos regulares iguais;
- e em todos os seus vértices encontram-se o mesmo número de arestas.

Sólidos Platônicos

Um *Sólido Platônico* é um poliedro convexo com duas exigências.

Poliedro: é um sólido limitado por polígonos;

Convexo: qualquer reta secante possui exatamente dois pontos em comum com o poliedro.

- todas suas faces são polígonos regulares iguais;
- e em todos os seus vértices encontram-se o mesmo número de arestas.

Sólidos Platônicos

Um *Sólido Platônico* é um poliedro convexo com duas exigências.

Poliedro: é um sólido limitado por polígonos;

Convexo: qualquer reta secante possui exatamente dois pontos em comum com o poliedro.

- todas suas faces são polígonos regulares iguais;
- e em todos os seus vértices encontram-se o mesmo número de arestas.

Sólidos Platônicos

Tetraedro

Hexaedro (Cubo)

Octaedro

Dodecaedro

Icosaedro

Os Sólidos no dia a dia

Existem formas cristalinas naturais:

Figure: Calcopirita (Tetraedro), Galena (Hexaedro), Magnetita (Octaedro).

Os Sólidos no dia a dia

Protozoários amebóides encontrados por Ernst Haeckel em 1904.

Figure: Radiolários: *Callimitra agnesae*, *Lithocubus geometricus*, *Circoporus octahedrus*, *Circorrhagma dodecahedrus*, *Circognia icosahedrus*.

Os Sólidos no dia a dia

Na arquitetura: doma geodésica a partir de poliedros regulares platônicos com faces triangulares.

Figure: Casa cor Jardim Botânico do Recife-PE.

Números notáveis nos Sólidos Platônicos

Sólido Platônico	Número de faces	Número de vértices	Número de arestas	Número de arestas por face
Tetraedro	4	4	6	3
Cubo	6	8	12	4
Octaedro	8	6	12	3
Dodecaedro	12	20	30	5
Icosaedro	20	12	30	3

Dualidade dos Sólidos Platônicos

Considere o centro de cada face, e conecte com segmentos os centros de faces vizinhas.

Desta maneira, construímos um Sólido Platônico dual.

Dualidade dos Sólidos Platônicos

Considere o centro de cada face, e conecte com segmentos os centros de faces vizinhas.

Desta maneira, construímos um Sólido Platônico dual.

Figure: Poliedro dual de cada sólido Platônico.

Grupos de simetria dos Sólidos Platônicos

Imagine que escolhamos um dos sólidos e o fixemos no espaço.

Se quiséssemos mover este sólido no espaço, sem deformá-lo, e desejássemos contar todas as possíveis configurações, como poderíamos fazer isso?

A resposta é justamente o grupo de simetria!

Pecisamos deixar claro duas coisas:

- O que é um grupo?
- O que significa '*mover sem deformar*'.

Relembre/Conheça algo novo

Grupo

É o par $(G, *)$ formado por um conjunto não vazio G e uma operação $*: G \times G \rightarrow G$ que seja associativa, possua elemento neutro e todo elemento possua inverso. Simplificamos a notação por G .

A ordem do grupo G , denotada por $|G|$, é a sua cardinalidade.

Exemplinhos:

- $(\{e\}, *)$ é o grupo mais simples.
- **Grupo cíclico:** gerado por um único elemento.
 $\mathbb{Z} = (\mathbb{Z}, +)$ é gerado por 1 e tem infinitos elementos.
 $\mathbb{Z}_2 = (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, +) = \{\bar{0}, \bar{1}\}$ é gerado por $\bar{1}$ e tem 2 elementos.
 $C_n = \langle g \rangle$ grupo cíclico de ordem n .

Relembre/Conheça algo novo

Grupo

É o par $(G, *)$ formado por um conjunto não vazio G e uma operação $*: G \times G \rightarrow G$ que seja associativa, possua elemento neutro e todo elemento possua inverso. Simplificamos a notação por G .

A ordem do grupo G , denotada por $|G|$, é a sua cardinalidade.

Exemplinhos:

- $(\{e\}, *)$ é o grupo mais simples.
- **Grupo cíclico:** gerado por um único elemento.
 $\mathbb{Z} = (\mathbb{Z}, +)$ é gerado por 1 e tem infinitos elementos.
 $\mathbb{Z}_2 = (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, +) = \{\bar{0}, \bar{1}\}$ é gerado por $\bar{1}$ e tem 2 elementos.
 $C_n = \langle g \rangle$ grupo cíclico de ordem n .

Relembre/Conheça algo novo

Grupo

É o par $(G, *)$ formado por um conjunto não vazio G e uma operação $*: G \times G \rightarrow G$ que seja associativa, possua elemento neutro e todo elemento possua inverso. Simplificamos a notação por G .

A ordem do grupo G , denotada por $|G|$, é a sua cardinalidade.

Exemplinhos:

- $(\{e\}, *)$ é o grupo mais simples.
- **Grupo cíclico:** gerado por um único elemento.

$\mathbb{Z} = (\mathbb{Z}, +)$ é gerado por 1 e tem infinitos elementos.

$\mathbb{Z}_2 = (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, +) = \{\bar{0}, \bar{1}\}$ é gerado por $\bar{1}$ e tem 2 elementos.

$C_n = \langle g \rangle$ grupo cíclico de ordem n .

Relembre/Conheça algo novo

Grupo

É o par $(G, *)$ formado por um conjunto não vazio G e uma operação $*: G \times G \rightarrow G$ que seja associativa, possua elemento neutro e todo elemento possua inverso. Simplificamos a notação por G .

A ordem do grupo G , denotada por $|G|$, é a sua cardinalidade.

Exemplinhos:

- $(\{e\}, *)$ é o grupo mais simples.
- **Grupo cíclico:** gerado por um único elemento.
 $\mathbb{Z} = (\mathbb{Z}, +)$ é gerado por 1 e tem infinitos elementos.

$\mathbb{Z}_2 = (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, +) = \{\bar{0}, \bar{1}\}$ é gerado por $\bar{1}$ e tem 2 elementos.

$C_n = \langle g \rangle$ grupo cíclico de ordem n .

Relembre/Conheça algo novo

Grupo

É o par $(G, *)$ formado por um conjunto não vazio G e uma operação $*: G \times G \rightarrow G$ que seja associativa, possua elemento neutro e todo elemento possua inverso. Simplificamos a notação por G .

A ordem do grupo G , denotada por $|G|$, é a sua cardinalidade.

Exemplinhos:

- $(\{e\}, *)$ é o grupo mais simples.
- **Grupo cíclico:** gerado por um único elemento.
 $\mathbb{Z} = (\mathbb{Z}, +)$ é gerado por 1 e tem infinitos elementos.
 $\mathbb{Z}_2 = (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, +) = \{\bar{0}, \bar{1}\}$ é gerado por $\bar{1}$ e tem 2 elementos.
 $C_n = \langle g \rangle$ grupo cíclico de ordem n .

Relembre/Conheça algo novo

Grupo

É o par $(G, *)$ formado por um conjunto não vazio G e uma operação $*: G \times G \rightarrow G$ que seja associativa, possua elemento neutro e todo elemento possua inverso. Simplificamos a notação por G .

A ordem do grupo G , denotada por $|G|$, é a sua cardinalidade.

Exemplinhos:

- $(\{e\}, *)$ é o grupo mais simples.
- **Grupo cíclico:** gerado por um único elemento.
 $\mathbb{Z} = (\mathbb{Z}, +)$ é gerado por 1 e tem infinitos elementos.
 $\mathbb{Z}_2 = (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, +) = \{\bar{0}, \bar{1}\}$ é gerado por $\bar{1}$ e tem 2 elementos.
 $C_n = \langle g \rangle$ grupo cíclico de ordem n .

Relembre/Conheça algo novo

- **Grupo diedral** D_m : o grupo das simetrias de um polígono regular de $m \geq 3$ lados. D_m é um grupo com a operação **composição** e sua ordem é $2m$.

Vamos fazer o caso $m = 4$, isto é, queremos estudar o grupo de simetria do quadrado.

Mover o quadrado no plano, sem deformá-lo,
só nos permite rotacioná-lo, ou refleti-lo.

Relembre/Conheça algo novo

- **Grupo diedral** D_m : o grupo das simetrias de um polígono regular de $m \geq 3$ lados. D_m é um grupo com a operação **composição** e sua ordem é $2m$.

Vamos fazer o caso $m = 4$, isto é, queremos estudar o grupo de simetria do quadrado.

Mover o quadrado no plano, sem deformá-lo,
só nos permite rotacioná-lo, ou refleti-lo.

Relembre/Conheça algo novo

Exemplo: Opere $r_1 \circ f_3$ e veja que elemento é.

Relembre/Conheça algo novo

- **Grupo das permutações S_n :** o grupo das permutações de um conjunto com n elementos. É um grupo com a operação composição e sua ordem é $n!$.

Vamos fazer o caso para $n = 3$.

Precisamos encontrar as permutações de 3 elementos, isto é, as $3! = 6$ configurações possíveis.

Para facilitar a nossa vida, podemos nomear os elementos do conjunto por 1, 2 e 3.

Relembre/Conheça algo novo

- **Grupo das permutações** S_n : o grupo das permutações de um conjunto com n elementos. É um grupo com a operação composição e sua ordem é $n!$.

Vamos fazer o caso para $n = 3$.

Precisamos encontrar as permutações de 3 elementos, isto é, as $3! = 6$ configurações possíveis.

Para facilitar a nossa vida, podemos nomear os elementos do conjunto por 1, 2 e 3.

Relembre/Conheça algo novo

Os 6 elementos do grupo são:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

id **(23)** **(13)**

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

(12) **(132)** **(123)**

Exemplo: Componha $(23)(13)$ e $(12)(13)$:

Relembre/Conheça algo novo

- **Grupo das permutações pares A_n :** Uma permutação é par se ela pode ser representada como um produto de um número par de transposições (2-ciclo). A_n é um grupo (subgrupo de S_n) com a operação composição e sua ordem é $\frac{n!}{2}$.

Para $n = 3$, pudemos observar que as permutações pares são $(132) = (23)(13)$ e $(123) = (12)(13)$. Logo, A_3 é grupo formado por:

$$\begin{array}{ccc} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} \\ \text{id} & (132) & (123) \end{array}$$

Exercício: Opere $(132)^2 = (132)(132)$ e $(132)(123)$.
Quem é o inverso de cada elemento?

Relembre/Conheça algo novo

- **Grupo das permutações pares A_n :** Uma permutação é par se ela pode ser representada como um produto de um número par de transposições (2-ciclo). A_n é um grupo (subgrupo de S_n) com a operação composição e sua ordem é $\frac{n!}{2}$.

Para $n = 3$, pudemos observar que as permutações pares são $(132) = (23)(13)$ e $(123) = (12)(13)$. Logo, A_3 é grupo formado por:

$$\begin{array}{ccc} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} \\ \text{id} & (132) & (123) \end{array}$$

Exercício: Opere $(132)^2 = (132)(132)$ e $(132)(123)$.
Quem é o inverso de cada elemento?

Voltando para os sólidos

Estamos em busca do grupo de simetria de cada Sólido Platônico.
Para isto, desejamos mover o sólido de maneira isométrica.

Lembre-se/Aprenda:

Uma *isometria* em $\mathbb{R}^n$ é uma função bijetora $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ que preserva distâncias.

Ou seja,

$$\|f(x) - f(y)\| = \|x - y\|, \quad \text{para todo } x, y \in \mathbb{R}^n$$

na qual “ $\|\cdot\|$ ” é a norma Euclidiana.

O conjunto $\text{Isom}(\mathbb{R}^n)$ constituído por tais aplicações é um grupo com a composição de funções.

Voltando para os sólidos

Estamos em busca do grupo de simetria de cada Sólido Platônico. Para isto, desejamos mover o sólido de maneira isométrica.

Lembre-se/Aprenda:

Uma *isometria* em $\mathbb{R}^n$ é uma função bijetora $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ que preserva distâncias.

Ou seja,

$$\|f(x) - f(y)\| = \|x - y\|, \quad \text{para todo } x, y \in \mathbb{R}^n$$

na qual “ $\|\cdot\|$ ” é a norma Euclidiana.

O conjunto $\text{Isom}(\mathbb{R}^n)$ constituído por tais aplicações é um grupo com a composição de funções.

Voltando para os sólidos

Estamos em busca do grupo de simetria de cada Sólido Platônico. Para isto, desejamos mover o sólido de maneira isométrica.

Lembre-se/Aprenda:

Uma *isometria* em $\mathbb{R}^n$ é uma função bijetora $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ que preserva distâncias.

Ou seja,

$$\|f(x) - f(y)\| = \|x - y\|, \quad \text{para todo } x, y \in \mathbb{R}^n$$

na qual “ $\|\cdot\|$ ” é a norma Euclidiana.

O conjunto $\text{Isom}(\mathbb{R}^n)$ constituído por tais aplicações é um grupo com a composição de funções.

Mas qual é a cara de $\text{Isom}(\mathbb{R}^n)$?

Uma descrição mais precisa destas isometrias é a seguinte:

$$f \in \text{Isom}(\mathbb{R}^n) \iff \begin{cases} \exists A \text{ matriz ortogonal de ordem } n \times n \\ \text{e } v \in \mathbb{R}^n \text{ tal que } f(x) = Ax + v. \end{cases}$$

Lembre-se: $A_{n \times n}$ é ortogonal se $A^{-1} = A^T$. Exemplos importantes:

- Matriz identidade;
- Matriz ortogonal com determinante 1 $\rightarrow$ rotações;
- Matriz ortogonal com determinante -1 $\rightarrow$ reflexões.

Mas qual é a cara de $\text{Isom}(\mathbb{R}^n)$?

Uma descrição mais precisa destas isometrias é a seguinte:

$$f \in \text{Isom}(\mathbb{R}^n) \iff \left\{ \begin{array}{l} \exists A \text{ matriz ortogonal de ordem } n \times n \\ \text{e } v \in \mathbb{R}^n \text{ tal que } f(x) = Ax + v. \end{array} \right.$$

Lembre-se: $A_{n \times n}$ é ortogonal se $A^{-1} = A^T$. Exemplos importantes:

- Matriz identidade;
- Matriz ortogonal com determinante 1 $\rightarrow$ rotações;
- Matriz ortogonal com determinante -1 $\rightarrow$ reflexões.

E cadê os grupos de simetria?

Os subgrupos de $\text{Isom}(\mathbb{R}^n)$ são justamente os subconjuntos das funções f que fixam subconjuntos de $\mathbb{R}^n$.

Concretamente, seja $X \subset \mathbb{R}^n$ um subconjunto contendo a origem.

O grupo de simetrias de X será

$$S(X) = \left\{ f \in \text{Isom}(\mathbb{R}^n) \mid f(X) = X \right\}.$$

Destacaremos o subgrupo de $S(X)$ das rotações de X , denotado por $R(X)$:

$$R(X) = \left\{ f \in \text{Isom}(\mathbb{R}^n) \mid f(x) = Ax, \text{ com } A \text{ ortogonal e } \det A = 1 \right\}.$$

E cadê os grupos de simetria?

Os subgrupos de $\text{Isom}(\mathbb{R}^n)$ são justamente os subconjuntos das funções f que fixam subconjuntos de $\mathbb{R}^n$.

Concretamente, seja $X \subset \mathbb{R}^n$ um subconjunto contendo a origem.

O grupo de simetrias de X será

$$S(X) = \left\{ f \in \text{Isom}(\mathbb{R}^n) \mid f(X) = X \right\}.$$

Destacaremos o subgrupo de $S(X)$ das rotações de X , denotado por $R(X)$:

$$R(X) = \left\{ f \in \text{Isom}(\mathbb{R}^n) \mid f(x) = Ax, \text{ com } A \text{ ortogonal e } \det A = 1 \right\}.$$

Rotações do tetraedro

Há duas escolhas para o eixo de rotação:

- Eixo de rotação L passando por um vértice e pelo centro da face oposta. Com ângulo de rotação $\frac{2\pi}{3}$ e $\frac{4\pi}{3}$, respectivamente. Levando em conta as quatro possíveis escolhas de vértice, obtemos 8 rotações.

Rotações do tetraedro

- Eixo de rotação M passando pelo ponto médio de uma das arestas e pelo ponto de médio da aresta oposta (aquela que resulta da interseção das faces, que não contém a aresta onde fixamos o primeiro ponto médio). Com ângulo de rotação π .
Considerando as três possíveis escolhas de pares de arestas, obtemos 3 rotações.

8 rotações + 3 rotações + identidade = 12 rotações, e assim $|R(X)| = 12$.

Rotações do tetraedro

Note que essas rotações permutam os vértices do tetraedro, e portanto, podemos associá-las a uma permutação em S_4 :

Enumere os vértices do tetraedro de 1 a 4, e denotarmos por $p_{i,j}$ o ponto médio da aresta com extremos nos vértices i e j . Deste modo, podemos representar as rotações da seguinte forma:

$$\text{Eixo L passando pelo vértice 1 e ângulo } \frac{2\pi}{3} \quad \mapsto \quad (234).$$

$$\text{Eixo L passando pelo vértice 1 e ângulo } \frac{4\pi}{3} \quad \mapsto \quad (243).$$

$$\text{Eixo M passando por } p_{2,3}, p_{1,4} \text{ e ângulo } \pi \quad \mapsto \quad (23)(14).$$

Logo, $R(X) \cong A_4$.

Exercícios

Vamos testar se entemos o conjunto da rotações.

- Calcule o grupo de rotações do cubo, que também vale para o seu dual o octaedro.
- Calcule o grupo de rotações do dodecaedro, que também vale para o seu dual o icosaedro.

E pra ajudar na tarefinha...

Grupos de simetria dos Sólidos Platônicos

Seja X um sólido platônico e C_2 um grupo cíclico de ordem 2, então

- (i) $S(X) \cong S_4$ e $R(X) \cong A_4$, se X for um tetraedro.
- (ii) $S(X) \cong S_4 \times C_2$ e $R(X) \cong S_4$, se X for um cubo ou um octaedro.
- (iii) $S(X) \cong A_5 \times C_2$ e $R(X) \cong A_5$, se X for um dodecaedro ou um icosaedro.